

ROSACEAE — ՎԱՐԴԱԳԳԻՆԵՐ — РОЗОЦВЕТНЫЕ

404. *Potentilla cryptophila* Bornm. — Մարմունի քարանձավային — Лапчатка пещерная

EN B1 ab(iii) + 2 ab(iii)



© ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

Սկզբանապերյան հղում | References

Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի նյութեր
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Ханджян Н. С. Новые и редкие для Кавказа и Армении виды Potentilla L. (Rosaceae). Флора, растительность и растительные ресурсы Армении, 17. Ереван (в печати).
Կոմիտաս Ա. Խանճյան
Compiler N. Khandjyan

Կապեզորիս: Վտանգված տեսակ է: Տարածման շրջանի մակերեսը՝ 5000 քառ. կմ՝ ից պակաս է, բնակության շրջանի մակերեսը՝ 500 քառ. կմ՝ ից պակաս:

Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված չէ:

Ընդգրկված չէ. CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Նկարագրություն: Բազմամյա մետարասանման առսեղմ քափուտուրյամբ սպիտակավոն բույս՝ մինչև 10 սմ բարձրությամբ, զյասվոր հաստ առանցքային արմատով: Արմատամերձ տերևները՝ երկար կորերով, փոքր, մատանած՝ կազմված 5 հաստակվուն, հակածված տերևիկներից; ցողունայինները՝ եռմասնայա: Ծաղկաբույլ՝ նոր, սակավածաղկի: Ծաղիկները՝ 3–5; պսակաբերքերը, ինչպես նաև բաժակաբերքերը՝ 5-ական, սպիտակավոն, մուգ ծիրանագոյն զղերով: Պտուղը՝ բազմաթիվզիկի: Գեղազարդային բույս է:

Տարածում: Հայաստանում հանդիպում է. Գեղամա (Լեռնազարք՝ Սպիտակ սար), Դարելեզիսի (Լեռնազարք՝ Գողի) և Զանգեզորի (Դարարաս գյուղից վերև) ֆրիխատիկական շրջաններում: EOO՝ 2100 քառ. կմ, AOO՝ 12 քառ. կմ, լոկալիտետներ՝ 3: Հայաստանի բացի աճում է Թալիշում և Իրանում (Էլբրուս):

Կենսաբանական, էկոլոգիական և ֆիզիոլոգիական առանձնահարկություններ: Աճում է ալպյան գոտում, ծ. մ. 2800–3400 մ բարձրությունների վրա, բարքարոտ խճարարոտ զափրափի լանջերին, բարարափածճների և երարխիան ապարների վրա: Ծաղկում է հունիս–օգոստոս ամիսներին, պաղպաղերում՝ օգոստոս–սեպտեմբերին:

Սահմանափակող գործուներ: Սահմանափակ բնակության շրջան: Աճելավայրերի կորուստ կամ դեղրադացիա հատկապես կիրայի փոփոխության հետևանքով:

Պահպանության միջոցառություններ: Չի պահպանվում: Անհրաժեշտ է իրականացնել նոր աճելավայրերի որոնում, հայտնի պապուլյացիաների վիճակի մոնիթորինգ, որպես գեղազարդային բույս աճեցնել բուսաբանական այգիներում, ներդնել ծաղկեզրծության մեջ:

Category. Endangered species. The extent of occurrence is less than 5000 square kilometers, area of occupancy is less than 500 square kilometers

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Perennial, appressed sericeous-pubescent herb with thick main root. Basal leaves long-petiolate, quinquepartite, with almost rhomboid, deeply, almost pinnate incised-dentate leaflets, on thickish petiolules; cauline leaves triplicate. Inflorescence loose, few-flowered. Flowers 3–5, pentamerous. Sepals light pink or white, with thin purple veins. Fruit a multinucula.

Distribution. In Armenia it occurs in Gegham (mountain Spitaksar), Darellegis (mountain Gogi) and Zangezur (vicinity of Darabas village) floristic regions. EOO is 2100 km², AOO is 12 km², the number of locations is 3. Besides Armenia the species grows in Talish and Iran (Elburz).

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in alpine belt, at the altitudes of 2800–3400 meters above sea level, on rocky and stony slopes, on screes and volcanic rocks. Flowering from July to August, fruiting from August to September.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, loss/degradation of habitats caused by global climate change.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: search of new habitats, monitoring of the population state, to cultivate in botanical gardens as decorative plant, introduction into floriculture.

ROSACEAE — ՎԱՐԴԱՀԱԳԻՆԵՐ — РОЗОЦВЕТНЫЕ

405. *Potentilla erecta* (L.) Hampe — Մարմունի ուղիղ — Лапчатка прямостоячая



www.korseby.net

Կարենորիս: Կրիավիկական վիճակում զտնվող տեսակ է: Տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 10 քառ. կմ-ից պահանջական է: Տեսակին սպառնում է անհետացում ածելավայրերի պայմանների փոփոխական պատճառով:

Հայաստանի Կարմիր զրի առաջին իրատարակության մեջ բնդզրկված էր:

Ընդգրկված չէ CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Նկարգրություն: Բազմային խառարույս՝ 10–30 մ բարձրության: Յարուները՝ նորք, կիմքից՝ մեկական բարձրացող, վերևում ետանածէ ճպարափարփած, մինչև զագար տերևակալած: Տերևները՝ եռմասնյա, համարյա մերկ կամ ծածկված եղավի մազիկներով: Ծաղիկները փառ դժոխն, մեկական, 10–13 մմ տրամագծով, վերին տերևների անորոշներից դորս եկող բարակ երկար ծաղկակործիքի վրա: Բաժակարերերը և պատկարերերը՝ 4–ական: առջները՝ բազմաթիվ: Ծաղ-

Կակալը կասպինում: Պատուի կազմված բազմաթիվ բնկյալիներից:
Տարածում: Հայաստանում հանդիպում է ճիշճի Լռու ֆորփա-
տիկական շրջանում (Զորագետի գերին հոսանք, Օրսն-Լոռի, Կոր-
լիճ): AOO' 8 քառ. կմ, թիկալիտնոր՝¹ 1: Հայաստանից բացի, առողի-
ւ Կովկասում, մասնավորապես Մեծ Կովկասի և Անդրկովկասի-
արևմայսն հասկածներում, հազվալեա Դադաստանում, ինչպես նաև
Եվրոպայում (բացի հարավային շրջաններից), Արևմայսն Միջիրում
և Հայստանի Աներիկայում:

Կենարանական, Էլորդիսական և Փիրոցնորոշիական առանձնահարկություններ: Առմտ է միջին լանջային գոտուն, ծ. մ.1500–1800մ բարձրաբարյանների վրա, խոնավացած տեղերում, մերի ափերին: Ծաղկում է հոնիս-հովիս ամսին, պատարերում՝ հովիս-օգոստոսին:

Սահմանափակող գործոններ: Սահմանափակ տարածման և բնակության շրջաններ, աճելավայրերի կրորաս կամ դեգրադացիա՝ տնտեսական գործունեության ընդլայնման հետևանքով, կիմայի գրաւայ փոփոխաթետին:

Պահպանության միջոցառություններ: Չի պահպանվում: Անհրաժեշտ է իրականացնել պրավադայի վիճակի նոնիբարինք, սաեղծել նոր ԲՀՊՏ-ի Լուս սարսահարքի լերի տարածքում:

Category. Critically endangered species. The extent of occurrence and area of occupancy are less than 10 km². The species faces extinction because of changes in habitat conditions.

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia. It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Perennial herb 10–30 cm. Stems tender, solitary, ascending, furcated branched in upper part, densely foliated. Leaves tripartite, almost glabrous or with sparse hairs. Flowers bright yellow, solitary, 10–13 mm in diameter, on thin pedicels, axillary in the upper leaves, quadrimerous. Receptacle domed. Fruit a multinucula.

Distribution. It occurs only in Lori floristic region (upper stream of Dzoraget, Oran–Lori Klor lake). AOO is 8 km², the number of locations is 1. Besides Armenia it grows in the Caucasus, Europe (except southern regions), West Siberia, North America.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in middle mountain belt, at the altitude of 1500–1800 meters above sea level, in wetlands, along lake shores. Flowering from June to July, fruiting from July to August.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, loss/degradation of habitats caused by the expansion of economic activities and global climate change.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: monitoring of the population state, establishment of specially protected nature area in the territory of Lori Plateau Lakes.

Այլ բնագիրներ\References

Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի
հերբարիումի նյութը
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Ханджян Н. С. Новые и редкие для Кавказа и Армении
виды *Potentilla* L. (Rosaceae). Флора, растительность и
растительные ресурсы Армении, 17. Ереван (в печати).
Կազմության հեղինակ
Compiler N. Khandjyan

ROSACEAE — ՎԱՐԴԱՉԳԻՆԵՐ — РОЗОЦВЕТНЫЕ

406. *Potentilla porphyrantha* Juz. — Մարնունի ծիրանավոր — Лапчатка порфировая

CR B I ab(iii) + 2 ab(iii)



© www.filuna.cz

Սկզբանադրյութեր\References

- Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում նյութեր
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Федоров А. А. 1958. Род *Potentilla* L. Флора Армении. 3: 79–120. Ереван.
Красная книга Армянской ССР. 1989: 211. Ереван.
Կազմություն. Խանջյան
Compiler N. Khandjyan

Կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ է: Հարավային Անդրկովկասի էնդեմիկ է: Տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 10 քառ. կմ՝ ից պակաս է: Արեալը խիստ մասնավոճ է:

Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված է և կարգավիճակով՝ ոչնչացման սպառնալիքի ենթակա տեսակ:

CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում ընդգրկված չէ:

Նկարագրություն: Բազմամյա մետաքանաման առսեղմ բափուտուրյամբ սպիտակավոն բույ 6–15 սմ բարձրության, զիսավոր հաստ առանցքային արմատով: Արմատամերձ տերևները՝ մատնաձև, 5 հաստավոն, հակածվածն, սեպածն իմբռով տերևիկներից; ցողունայինները՝ եռմասնա: Ծաղկաբույր՝ նոսր, սակավածաղիկ: Ծաղիկները՝ 5–15; պասկարթերը, ինչպես նաև բաժակարթերը բական, վատ ծիրանազուր, լավ արտահայտված մուգ գորշ ջղերով: Պտուղը՝ բազմաբնեկույզիկ: Գեղազարդային բույ է:

Տարածում: Հայաստանում հանդիպում է Գեղամի (լեռնազազարներ՝ Սևսար, Ազուսարկա) և Զանգեզորի (լեռնազազար՝ Մեծ Իշխանասար) ֆիորխատիկական շրջաններում: AOO՝ 8 քառ. կմ, լրացիտեսները՝ 2, որոնց միջև հեռավորությունը 130 կմ է: Հայաստանից բացի, աճում է Նախիջևանում:

Կենսաբանական, էկոլոգիական և ֆիրզենոլոգիական առանձնահարկություններ: Աճում է ալպյան գոտում, ծ. մ. 3300–3500 մ բարձրությունների վրա, բարքարոտ խճարարոտ զատիրափ լանջերին, բարարափակածքների վրա: Ծաղկում է հույս–օգոստոս ամիսներին, պտղաբերում՝ օգոստոս–սեպտեմբերին:

Սահմանափակող գործունեություն: Սահմանափակ բնակության շրջան: Աճելավայրերի կորուստ կամ դեղքաղացիա հատկապես կիմայի փոփոխության և երկրաբանական գործունեությի հետևանքով:

Պահպանության միջոցառություններ: Չի պահպանվում: Անհրաժեշտ է իրականացնել նոր աճելավայրերի որոնում, հայտնի պրապարագիաների վիճակի մոնիթորինգ, որպես գեղազարդային բույ աճեցնել բուսաբանական այգիներում, ներդնել ծաղկեգործության մեջ:

Category. Critically endangered species. Endemic of South Transcaucasia. The extent of occurrence and area of occupancy are less than 10 km². The area of distribution is severely fragmented.

It was included in the first edition of the Red Data Book of Armenia under Category 1: Endangered species.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Perennial, whitish appressed sericeous pubescent herb 6–15 cm, with thick main root. Basal leaves digitate, with 5 thickish obovate lobes and cuneate base; cauline leaves tripartite. Inflorescence loose. Flowers 5–15, pentamerous, bright purple with distinct dark veins. Fruit a multinucula. Ornamental plant.

Distribution. In Armenia it grows in Gegham (mountains Sevsar, Agusarka) and Zangezur (mountain Mets Ishkhanasar) floristic regions. AOO is 8 km², the number of locations is 2, the distance between which is 130 km. Besides Armenia it grows in Nakhichevan.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in alpine belt, at the altitude of 3300–3500 meters above sea level, on rocky and stony slopes, on screes and “chingils”. Flowering from July to August, fruiting from August to September.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, loss/degradation of habitats caused by geological factors and global climate change.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: search of new habitats, monitoring of the population state, to cultivate in botanical gardens as decorative plant, introduction into floriculture.

407. *Pyrus browiczii* Mulk. — Տանձենի Բռովիչի — Груша Бровича

CRB 1 ab(iii) + 2 ab(iii)



© ՀԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

Սկզբնադրյուրներ\References

- Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի նյութեր
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Мулкиджян Я. И. Новые для науки виды груши из Южного Закавказья. Докл. Ак АрмССР, 48: 234–237. Ереван.
Акопян Ж. А. 2007. О видах рода *Pyrus* (Rosaceae) в Армении. Флора, растительность и растительные ресурсы Армении, 16: 15–26. Ереван.
Կազմող՝ Ժ. Ա. Հակոբյան
Compiler Zh. A. Hakobyan

Կարեգորիա: Կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ է: Հայաստանի էնդեմիկ է: Հայտնի է բնական մեկ պրոպայլացիա 10 քառ. կմ-ից պահանջանակ և բնակուրյան շրջանների մակերեսում:

Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին իրատարակուրյան մեջ ընդգրկված չէ:

Ընդգրկված չէ CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Նկարագրություն: Տար մինչև 15 մ բարձրությամբ, խայ բրզան սաղարդով, խառ վիշերով: Տերևները՝ կիպարծած, մեծ, 6–8 սմ երկարության, 3–5 սմ լայնության, շատ բարակ, մերկ, մասն անհավասար աղեղնասառանավոր եզրերով; Կորունները՝ մինչև 4 սմ երկարության: Պատուները՝ վատ բափող բաժակի մասերով, տանձած, խար, 3–4 սմ երկարության, բարակ երկար պատասկորերով, մինչև 6 սմ երկարության:

Տարածում: Աճում է միայն Դարելեզօփիսի ֆլորիատիկական շրջանում (Եղեցիս գետի կիրճ, Հերմոն և Վարդահովիտ գյուղերի շրջակայր): AOO 8 քառ. կմ է, լիկայինտուր՝ 1:

Կենսաբանական, էկոլոգիական և ֆիզոգենոլոգիական առանձնահատկություններ: Աճում է վերին լեռնային գոտում, ծ. մ. 1700–2100 մ բարձրությանների վրա, լայնատերև անտառներում, անտառների և դաշտերի եզրերին, մարգագետններում: Ծաղկում է ապրիլ–մայիս ամիսներին, պտղաբերում՝ հունիս–սեպտեմբերին:

Սահմանափակող գործուներ: Սահմանափակ տարածման և բնակուրյան շրջաններ:

Պահպանության միջոցառություններ: Պահպանության գործողություններ չեն իրականացվում: Անհրաժեշտ է իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ՝ պոպուլյացիայի ծավալը և կառուցվածքը ճշտելու և նոր աճելափայրեր հայտնաբերելու համար, պոպուլյացիայի վիճակի մոնիթորինգ:

Category. Critically endangered species. Endemic of Armenia. Only one population is known. The extent of occurrence and area of occupancy are less than 10 km².

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Tree up to 15 m, with broadly pyramidal crown and thick spines. Leaves elliptic, large, 6–8 x 3–5 cm, unequal minute-crenate-dentate, thin, glabrous; petioles up to 4 cm long. Fruits with early deciduous calyx lobes, pyriform, 3–4 cm long, smooth; pedicels up to 6 cm long.

Distribution. In Armenia it grows only in Darelegis (Yeghegис river gorge, surroundings of Hermon and Vardahovit villages) floristic region. AOO is 8 km², the number of locations is 1.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in upper mountain belt, at the altitude of 1700–2100 meters above sea level, in broad-leaved forests, at the edges of fields and forests, in the meadows. Flowering from April to May, fruiting from June to September.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: survey on population numbers and range, search of new habitats, monitoring of the state of the population.

ROSACEAE — ՎԱՐԴԱՉԳԻՆԵՐ — РОЗОЦВЕТНЫЕ

408. *Pyrus complexa* Rubtzov — Տանձենի խառնված — Груша смешанная

EN B1 ab(iii) + 2 ab(iii)



© ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

Ակդեմիական հղումներ\References

- Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում նյութեր
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Рубцов Г. А. 1941. Новые виды груши. Бот. мат. (Ленинград), 9, 2: 69–82.
Федоров А. А. 1958. Род Pyrus. Флора Армении, 3: 247. Ереван.
Акопян Ж. А. 2007. О видах рода Pyrus (Rosaceae) в Армении. Флора, растительность и растительные ресурсы Армении, 16: 15–26. Ереван.
Կազմող՝ Ժ. Ա. Հակոբյան
Compiler Zh. A. Hakobyan

Կապելովիչիս: Վասանգված տեսակ է: Հայաստանի էնդեմիկ է: Արևալլ խփան մասնաւոված է: Տարածման շրջանի մակերեսը՝ 5000 քառ. կմ՝ ից պակաս է, բնակչության շրջանի մակերեսը՝ 500 քառ. կմ՝ ից պակաս:

Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին իրատարակության մեջ ընդգրկված չէ:

Ընդդրկված չէ CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Նկարագրություն: Ծառ՝ մինչև 10 մ բարձրությամբ, փշիկներով: Տերևները՝ էլիպսաձև, 6,5–8 սմ երկարության, 3,5–4 սմ բայցության, վերևում՝ կարծ սրացած, աղեղնասպանացր երկու կողմից խփան բաղադրյամբ, սպիտակավուն, կորերը՝ բավարար: Պտուղները՝ դեղնավուն, տափակացածկրբավուն, մանր, 2–3 սմ տրամագծով, կորերը՝ բարակ, պատիճն հավասար երկարությամբ:

Տարածում: Հանդիսանում է Գեղամի (Միլի գետի կիրճ), Դարելիցիսկի (Խաչիկ, Եղեգիս գետի կիրճ) և Մեղրու (Գուդեմինս, Վանք, Ջինդարա, Մուլք, Վահրամափար) ֆլորիստիկական շրջաններում: EOO 3240 քառ. կմ է, AOO՝ 20 քառ. կմ, բնակչությունը՝ 4:

Կենսաբանական, էկոլոգիական և ֆիզիոգենոլոգիական առանձնահատկություններ: Աճում է միջին և վերին լեռնային զույգություն, ծ. մ. 1200–2100 մ բարձրությունների վրա, լայնատերև անտառներում, անտառների եզրերին: Ծաղկում է ապրիլ–մայիս ամիսներին, պտղաբերում՝ հունիս–սեպտեմբերին:

Սահմանափակող գործունեություն: Սահմանափակ տարածման և բնակչության շրջաններ, ածելավայրերի կորուս կամ դեղքալացիա՝ հողատարածքների յուրացման հետևանքով:

Պահպանության միջոցառություններ: Պահպանության գործուրություններ չեն իրականացվում: Անհրաժեշտ է իրականացնել պարույցիայի վիճակի մոնիթորինգ:

Category. Endangered species. Endemic of Armenia. The area of distribution is fragmented. The extent of occurrence is less than 5000 km², area of occupancy is less than 500 km².

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Spiny tree up to 10 m. Leaves on the both sides densely tomentose, whitish, elliptic, 6,5–8 x 3,5–4 cm, shortly acuminate at apex, crenate-serrate at margins; petioles tomentose. Fruits yellowish, compressed-orbiculate, small, 2–3 cm in diameter; pedicles thin, almost equal to the fruit.

Distribution. In Armenia it occurs in Gegham (Milli river gorge), Darelegis (Khachik, Yeghegus river gorge) and Meghri (Gudemnis, Vank, Djindara, Mulk, Vahramar) floristic regions. EOO is 3240 km², AOO is 20 km², the number of locations is 4.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in middle and upper mountain belts, at the altitudes of 1200–2100 meters above sea level, in broad-leaved forests, at forest edges. Flowering from April to May, fruiting from June to September.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, loss/degradation of habitats caused by land development.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: monitoring of the population state.

409. *Pyrus daralagezi* Mulk. — Տանձենի դարեղեզիսի — Груша даралегисская

EN B1 ab(iii) + 2 ab(iii)



© ՀԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

Ակղքնադրյութեր\References

- Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի նյութեր
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Мулкиджанян Я. И. 1969. Новые для науки виды груш из Южного Закавказья. Докл. АН АрмССР, 48, 4: 234–237. Ереван.
Акопян Ж. А. 2007. О видах рода *Pyrus* (Rosaceae) в Армении. Флора, растительность и растительные ресурсы Армении, 16: 15–26. Ереван.
Կազմով՝ Ժ. Ա. Հակոբյան
Compiler Zh. A. Hakobyan

Կարենության: Վասնագված տեսակ 1: Հայաստանի էնդեմիկ է:
Արեալը խիստ մասնատված է: Տարածման շրջանի մակերեսը 5000
քառ. կմ՝ ից պակաս է, քանիուրյան շրջանի մակերեսը՝ 500 քառ. կմ—
ից պակաս:

Հայաստանի Կարմիր գրքի ստացին հրատարակության մեջ
ընդգրկված չէ:

Ընդգրկված չէ նաև CITES-ի և Բեռնի կրնկենցիաների հավել-
վածներում:

Նկարագրություն: Ծառ՝ 5 մ բարձրության, բրգած և սաղարքով:
Տերևները՝ էլիպսաձև, 8–10 սմ երկարության, 3–5 սմ լայնության, հիմ-
րում՝ լայն—սեպաձև, զագարի մոտ՝ կարճ սրացած, միանման ներա-
ցած երկու ծայրերում, մասն սրացած, բարիչավոր, վերկից՝ մերկ,
տակից՝ ցրված մազիկներով: Պտուղները՝ տանձաձև, կորը՝ հաստա-
վուն, մինչև 3–4 սմ երկարության:

Տարածում: Հանդիպում է Դարեղեզիսի (Եղեգիս գետի կիրճ, Ձեր-
մուկ, Կեչուտ) և Զանգեզուրի (Տաշտուն) ֆլորիստիկական շրջաննե-
րում: EOO 520 քառ. կմ է, AOO՝ 20 քառ. կմ, լոկալիտետներ՝ 3:

**Կենսաբնական, էկոլոգիական և ֆիզոցենոլոգիական
առանձնահատկություններ:** Առանձ է վերին լեռնային գոտում, ծ.
մ. 1700–2200 մ բարձրությունների վրա, լայնաների անտառներում:
Ծաղկում է ապրիլ—մայիս ամիսներին, սպորտերում՝ հունիս—օգոս-
տոսին:

Սահմանափակող գործոններ: Սահմանափակ տարածման և
բնակության շրջաններ:

Պահպանության միջոցառություններ: Պահպանության գործողությու-
ություններ չեն իրականացվում: Անհրաժեշտ է իրականացնել սրացու-
յացիայի վիճակի նոնիբորին:

Category. Endangered species. Endemic of Armenia. The area of
distribution is fragmented. The extent of occurrence is less than 5000 km²,
area of occupancy is less than 500 km².

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Tree about 5 m, crown pyramide-shaped. Leaves elliptic,
8–10 x 3–5 cm, regularly narrowed at the both ends, at base broadly
cuneate, at apex shortly acuminate, at margins acutidentate, ciliate,
from above glabrous, from below sparsely hairy. Fruits pyriform, pedicles
thick, up to 3–4 cm long.

Distribution. In Armenia it occurs in Darelegis (Djermuk, Kechut,
Yeghegiz river gorge) and Zangezur (Tashtun) floristic regions. EOO is
520 km², AOO is 20 km², the number of locations is 3.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in
upper mountain belt, at the altitudes of 1700–2200 meters above sea level,
in broad-leaved forests. Flowering from April to May, fruiting from June
to August.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of
occupancy.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: monitoring
of the population state.

ROSACEAE — ՎԱՐԴԱՉԳԻՆԵՐ — РОЗОЦВЕТНЫЕ

410. *Pyrus elata* Rubtzov — Տանձենի բարձր — Груша высокая

EN B1 ab(iii) + 2 ab(iii)



© ՀԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

Սկզբանադրյութեավանք | References

- Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի ճյուղեր
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Рубцов Г. А. 1941. Новые виды груши. Бот. мат. (Ленинград), 9, 2: 69–82.
Федоров А. А. 1958. Род Pyrus. Флора Армении, 3: 239. Ереван.
Акопян Ж. А. О видах рода Pyrus (Rosaceae) в Армении. Флора, растительность и растительные ресурсы Армении, 16: 15–26. Ереван
Կազմող՝ Ժ. Ա. Հակոբյան
Compiler Zh. A. Hakobyan

Կապեկորիս: Վասնագված տեսակ է: Հայաստանի էնդեմիկ է: Տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 500 քառ. կմ–ից պակաս է:

Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին իրատարակության մեջ ընդգրկված չէ:

Ընդգրկված չէ CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հսկելվածներում:

Նկարագրություն: Հսկա ծառ՝ ավելի քան 20 մ բարձրության, բրզան սաղարթով և փշոտ ճյուղերով: Տերևները՝ կոր ողբածե, մեծ, 8,5–10 սմ երկարության, 4–5 սմ լայնության, աղցանեզր, բարակ թիստավոր ատամիկներով, ալիքավոր եզրով, վերևում՝ կարտկ սրացող, եկմրի մոտ՝ ավելի եղանակ, մերկ կամ թերևակի բավարար: Պտաղները՝ տանձածե, 5 սմ երկարության, 4 սմ լայնության, կանաչավոն–դեղին, կորը՝ մինչև 3 սմ երկարության:

Տարածում: Հանդիպում է Դարելիս գլանի կիրճ և Մելրու (Ձինդարս, Մոլց) ֆլորիստիկական շրջաններում: EOO 440 քառ. կմ է, AOO՝ 12 քառ. կմ, բնակչությունները՝ 2:

Կենսաբանական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններ: Աճում է միջին և վերին լանջային գոտիներում, ծ. մ. 1400–2300 մ բարձրությունների վրա, լայնատերև անսառներում: Ծաղկում է ապրիլ–մայիս ամիսներին, պտղաբերում՝ հունիս–սեպտեմբերին:

Սահմանափակող գործուներ: Սահմանափակ տարածման և բնակության շրջաններ:

Պահպանության միջոցառություններ: Պահպանության միջոցառություններ: Պահպանության միջոցառություններ: Անհրաժեշտ է իրականացնել պարույցիայի վիճակի մոնիթորինի:

Category. Endangered species. Endemic of Armenia. The extent of occurrence and the area of occupancy is less than 500 km².

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. High tree, more than 20 m, with pyramidate crown and spiny branches. Leaves rounded– rhomboidal, large, 8,5–10 x 4–5 cm; at margins undulate and serrate, with tenuiter aristulate teeth; at apex suddenly acutate; at base narrower; glabrous or slightly pubescent from below. Fruits pyriform, 5 x 4 cm, greenish-yellow; fructifer pedicel up to 3 cm.

Distribution. In Armenia it occurs in Darelegis (Yeghegис river gorge) and Meghri (Djindara, Mulk) floristic regions. EOO is 440 km², AOO is 12 s km², the number of locations is 2.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in middle and upper mountain belts, at the altitudes of 1400–2300 meters above sea level, in broad-leaved forests. Flowering from April to May, fruiting from June to September.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: monitoring of the population state.

ROSACEAE — ՎԱՐԴԱՉԳԻՆԵՐ — РОЗОЦВЕТНЫЕ

411. *Pyrus gergerana* Gladkova — Տանձենի հերհեր — Груша гергерская

EN B1 ab(iii) + 2 ab(iii)



© Կամլիկա Թամանյան
© Kamilla Tamanyan

Սկզբնապրյուներ\References

Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինսիտուտի հերբարիումի նյութեր \ Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.

Гладкова В. Н. 1990. Новые таксоны рода *Pyrus* L. (Rosaceae) из Закавказья. Новости сист. высш. раст., 27: 69–3. Санкт-Петербург.

Акопян Ж. А. 2007. О видах рода *Pyrus* (Rosaceae) в Армении. Флора, растительность и растительные ресурсы Армении, 16: 15–26. Ереван.

Կազմող՝ Ժ. Ա. Հակոբյան
Compiler Zh. A. Hakobyan

Կարեգորիա: Վտանգված տեսակ է: Հայաստանի ենդեմիկ է: Արեալը խիստ մասնավոր է: Տարածման շրջանի մակերեսը՝ 5000 քառ. կմ՝ ից պակաս է, բնակուրյան շրջանի մակերեսը՝ 500 քառ. կմ՝ ից պակաս:

Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված չէ:

Ընդգրկված չէ CITES-ի և Բեռնի կոմիտեին հավելվածությունում:

Նկարագրություն: Մեծ փշոտ ծառ է: Տերևները՝ լայն նշտարաձև, 7 սմ երկարության, 2,5 սմ լայնության, թթվալիք ասիմետրիկ, հիմքում եղու սեպաձև, աճրողաւեր կամ զազարում՝ թթվալիք սողցաւեր, վերևից՝ մերկ, մուգ կանաչ, փայլուն, տակից՝ անփայլ, երեսն բոյլ պատառության բավուրյամբ; Կորերը՝ մերկ 2–3,5 սմ երկարության: Պտուղը՝ մեծ, մինչև 3,5 սմ երկարության, փնտերով, տանձաձև:

Տարածում: Հանդիպում է Դարենիզիա (Հերհեր, Ջերմուկ), Զանգեզուրի (Սրաշեն) և Ստեռլի (Տաշտոն) ֆլորիստիկական շրջաններում: EOO 1850 քառ. կմ է, AOO՝ 20 քառ. կմ, լոկալիտետները՝ 4:

Կենսաբանական, էկոլոգիական և ֆիզոգենոլոգիական առանձնահատկություններ: Աճում է միջին և վերին լեռնային գոտիներում, ծ. մ. 1600–2200 մ բարձրությունների վրա, լայնատեր անտառներում: Ծաղկում է ապրիլ–մայիս ամիսներին, պտղաբերում՝ հունիս–օգոստոսին:

Սահմանափակող գործոններ: Սահմանափակ տարածման և բնակության շրջաններ, անձևավայրերի կրբաստ կամ դեղաբացիա՝ զուրածանուական հանդակների համար հողատարածքների յուրացման հետևանքով:

Պահպանության միջոցառություններ: Պոպուլյացիայի մի մասը պահպանում է «Հերհերի նորոտային» արգելավայրի տարածքում: Անհրաժեշտ է իրականացնել պոպուլյացիայի վիճակի մոնիթորինգ:

Category. Endangered species. Endemic of Armenia. The area of distribution is fragmented. The extent of occurrence is less than 5000 km², the area of occupancy is less than 500 km².

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. High spiny tree. Leaves broadly lanceolate, 7 x 2,5 cm, slightly asymmetric, at base narrowly cuneate, entire or slightly serrate at apex, from above glabrous, dark green, shiny, from below dull, sometimes slightly floccose; petioles glabrous, 2–3,5 cm long. Fruits large, up to 3,5 cm long, pyriform, in fascicles.

Distribution. In Armenia it grows in Darelegis (Herher, Djermuk), Zangezur (Srashen) and Meghri (Tashtun) floristic regions. EOO is 1850 km², AOO is 20 km², the number of locations is 4.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in middle and upper mountain belts, at the altitudes of 1600–2200 meters above sea level, in broad-leaved forests. Flowering from April to May, fruiting from June to August.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, habitats loss/degradation caused by land development for arable purposes.

Conservation actions. Part of the population grows in the area of “Herher” Reservation. Necessary: monitoring of the population state.

ROSACEAE – ՎԱՐԴԱԳԳԻՆԵՐ – РОЗОЦВЕТНЫЕ

412. Pyrus grossheimii Fed. — Տանձենի Գրոսհեյմի — Груша Гросгейма

$$ENB\;I\;ab(ii,iii,v) + 2\;ab(ii,iii,v)$$



© ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

Ակադեմիություններ\References

Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի
հեղաքիումից նորեք

Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Федоров А. А. 1938. Новый вид груши из лесов Талыша. Тр. Арм. фил. АН СССР, сер. Биол., 2: 202–205.
Ереван.

Акопян Ж. А. 2007. О видах рода *Pyrus* (Rosaceae) в Армении. Флора, растительность и растительные ресурсы Армении. 16: 15–26. Ереван.

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

Compiler Zh. A. Hakobyan

Վարեկորիս: Վտանգված տեսակ է: Հայտնի են 2 պոպուլյացիաներ: Տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 500 քառ. կմ-ից պակաս է:

Հայաստանի Կարմիր գործի առաջին իրատարակության մեջ բնողոքված չէր:

Ընդգրկված չեն առևտությունների հավելվածներում:

Նկարգրություն: Ծառ՝ մինչև 20 մ բարձրությամբ, առանց փշերի կամ բոլոր փշուտ: Տերևները՝ երկար ծաված, ծալիքած սրացած զագարով, ծավածները՝ կամ լիպսածներ, 6–10 սմ երկարության, 3–5 սմ լայնության, հիմքում՝ բուր-կլորավուն, սուր մանրատամնավոր, կորերը՝ բարակ, երկար: Պտտողները՝ 2–2,5 սմ տրամագծով, ծավածները՝ գնդածներ, վնջերով, կորերը՝ համարյա 3 անգամ պտուի երկարությանը գերազանցող:

Տարածում: Հանդիպում է Չափեգորիի (Արավոս գյուղի շրջակայր) և Սեղոր (Տաշտոն) ֆլորիստիկական շրջաններում: AOO՝ 16 քառ. կմ, լոկալիտետները՝ 2, որոնց միջև հեռավորությունը՝ 42 կմ է: Հայաստանից բացի, աճում է Թայիչում և Հյուսիսային Իրանում (Լոռուս):

Կենսաբանական, Էկոլոգիական և Փիզոքենոլոգիական արանձնահավկույթը Անդրեյ Վահագինը: Առում է միջին և վերին կենսային գոտիներում, ծ. մ. 1800–2300 մ բարձրությունների վրա, անտառներում, անտառների եղբերին։ Ծաղկում է ապրիլ–մայիս ամիսներին, պտղաբերում՝ հունիս–սեպտեմբերին։

Սահմանափակող գործուներ: Սահմանափակ տարածման և բնակության շրջաններ, կիմայի զորպալ վոփիխություն:

Պահպանության միջոցառումներ: Պահպանության գործողությունները չեն իրականացվում։ Անհրաժեշտ է իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ պոպուլյացիայի ծավալը և կառուցվածքը ջշտելու համար, պոպուլյացիայի փիճակի մոնիթորինգ։

Category. Endangered species. Two sub-populations are known. The extent of occurrence and the area of occupancy are less than 500 km².

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern

Description. Tree up to 20 m, without spines or slightly spiny. Leaves with attenuate, folded, acuminate apex, ovate or elliptic, 6–10 x 3–5 cm, obtuse-rounded at base, at margins acuti-minutiserrate; petioles thin, long. Fruits 2–2.5 cm in diameter, ovate-globose, in fascicles; pedicels almost 3 times longer than fruit.

Distribution. In Armenia it occurs in Zangezur (surroundings of Aravus village) and Meghri (Tashtun) floristic regions. AOO is 16 km², the number of locations is 2, the distance between which is 42 km. Besides Armenia grows in Talish and North Iran.


Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in middle and upper mountain belts, at the altitudes of 1800–2300 meters above sea level, in the forests and forest edges. Flowering from April to May, fruiting from June to September.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, global climate change.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: survey on population numbers and range, search of new habitats, monitoring of the state of the population.

413. Pyrus hyrcana Fed. — Сибирский яблоневый груша — Груша гирканская

ENB 1 ab(iii) + 2 ab(iii)



© ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՈՆԱԳՐԻ ԿԵՐպարկություն
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

References

Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի
հերթական հոգած համար

Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Федоров А. А. 1952. Комментарии. Гроссгейм А. А.
Флора Кавказа. 5: 421–422. Москва—Ленинград.

Акопян Ж. А. 2007. О видах рода *Pyrus* (Rosaceae) в Армении. Флора, растительность и растительные ресурсы

Արմենիա, 16: 15–26. Երևան
Կազմող՝ Ժ. Ա. Հակոբյան
Compiler Zh. A. Hakoobyan

Կարեկորիս: Կտանգված տեսակ 1: Հայտնի են երկու պարույրացիներ, որոնց տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 500 քառ. կմ -ից պակաս է:

Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ
ընդգրկված չէ:

Ընդգրկված չեն CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Նկարագրություն: Ծառ՝ մինչև 25 մ բարձրությամբ, սուսն Փշերի: Տերևները՝ ծվածք, 5–8 սմ երկարության, 3–5 սմ լայնության, սորմանափայտամանափոր, վերևում՝ բրավուն կամ թերևակի սրածած, հիմքի մոտ՝ հստված կամ համարյա սրտած, տակից՝ բարակ-բաղիքափոր: Կոթերը՝ բարակ, երկար, բիբելի երկարությամբ հսկաչար: Պտուղները՝ միայնակ կամ 2 (3), կոր սապակացած, 2,5–3 սմ տրամագծով, բաժակի մասերը՝ պատի ժամանակ սովոր կանգնած, պատկանած, բարակ բաղիքափոր: Կոթերը՝ կարճ:

Տարածություն: Հանճիլսպատ է Զանգեզուրի (Վաշագան, Ծավ, Խոստովի և Խոնազապարի ստորոտն) և Սեղմ (Ծփանձիոր) Փլրբխատիկական շրջաններում: EOO 200 քառ. կմ է, AOO՝ 16 քառ. կմ, բնակչությունը՝ 3: Հայաստանից քացի, ածում է Թալիշում և Հյուսիսային Երևանում (Ելրուր):

Կենսաբանական, վելոզիական և ֆիբոցենոլոցիական առանձնահարկություններ: Առում է միջին և վերին խռնային զոտիներում, ծ. մ. 1200–2100 մ բարձրությունների վրա, անտառներում, անտառների եզրերին: Ծաղկում է ապրիլ–մայիս ամիսներին, պատրաբերում հունիս–օգոստոսին:

Սահմանափակող գործունեք: Սահմանափակ տարածման և բնակության շրջաններ:

Պահպանության միջոցառություններ: Պապուլյացիայի մի մասը պահպանվում է՝ «Ծիկահոր» պետական արգելացի տարածքում։ Անհրաժեշտ է իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ՝ պրադրության հավաքը և կառուցվածքը ճշռելու և նոր աճելափայրեր հայտնաբերելու համար, պրադրության վիճակի մոնիթորինգ։

Category. Endangered species. Two sub-populations are known. The extent of occurrence and the area of occupancy are less than 500 km².

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Tree up to 25 m, without spines. Leaves finely tomentose from below, acutiserrate, ovate, 5–8 x 3–5 cm, obtuse or slightly acuminate at apex, truncate or almost cordate at base; petioles thin, long, almost equal to blades. Fruits solitary or by 2 (3), compressed-globose, 2.5–3 cm in diameter; calyx lobes at fruits erect, crown-shaped, finely tomentose; pedicels short.

Distribution. In Armenia it occurs in Zangezur (Vachagan, Tsav, Khustup Mountain) and Meghri (Shvanidzor) floristic regions. EOO is 200 km², AOO is 16 km², the number of locations is 3. Besides Armenia grows in Talish and North Iran (Elburs).

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in middle and upper mountain belts, at the altitudes of 1200–2100 meters above sea level, in the forests and forest edges. Flowering from April to May, fruiting from June to August.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy.

Conservation actions. Part of the population grows in the area of "Shikahogh" State Reserve. Necessary: survey on population numbers and range, search of new habitats, monitoring of the state of the population.

ROSACEAE – ՎԱՐԴԱԳԻՆԵՐ – РОЗОЦВЕТНЫЕ

414. Pyrus raddeana Woronow — Տանձենի Ո-աղղեի — Груша Радде



© Կամիլլա Թամանյան
© Kamilla Tamanyan

Ակղբնառընդունելու\References

Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի
հերթական գործադրությունները

Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA. Voronov Ю. H. 1924–1925. Материалы к познанию диких груш (*Pyrus s.str.*) Кавказского края. Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. 14, 2: 73–90. Москва.

Федоров А. А. 1958. Род *Pygus*. Флора Армении, 3: 235–248. Ереван.

Акопян Ж. А. 2007. О видах рода *Pyrus* (Rosaceae) в Армении. Флора, растительность и растительные ресурсы Армении. 16: 15–26.

Կազմության՝ Ժ. Ա. Հակոբյան

Կալեկորիս: Կտանգված տեսակ է: Հարավային Անդրկողվասի էնդեմիկ է: Տարածման և բնակուրյան շրջանների մակերեսը 500 քառ. կմ-ից պակաս է: Տեսակին սպառնում է տարածման և բնակուրյան շրջանների կրծառում՝ անտառային էկոհամակարգերի վրա շարունակվող ճարդածին ազդեցության պատճառով:

Հայաստանի Նարմիր զրբի առաջին հրատարակության մեջ
ընդգրկված էր:

Ընդգրկված չեն նաև CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Նվազագույնին: Ծառ՝ մոտ 5 մ բարձրության, առանց փշերի: Տերևները՝ երկարավուն էլիպսաձև, 6–8 սմ երկարության, 2–4 սմ լայնության, ամենամեծ լայնությամբ մնջտեղում, երկու ծայրերում հավասարաչափ ձգված ենդացող, սուր զագարով, հավասարաչափ աղեղնասղոցափոր եզրով, ներքինից՝ խիստ բաղդիքային բավուսությամբ: Կորերը՝ բավուս 3–4 սմ երկարության: Պատուները՝ ճանր, 2 սմ տրամագծով, զեղաձև, կորերը՝ պատիզ երկար:

Տարածություն: Հայաստանում հանդիպում է Զանգեզորի (Ներքին Հան) և Մելրո (Վահրավար, Տաշտոն, Լիճրվազ, Լիճը) ջրարհաստիկական շրջաններում: EOO՝ 160 քառ. կմ, AOO՝ 12 քառ. կմ է, լիղափառությունը՝ 2: Հայաստանից բացի՝ աճման է նաև Նախիջևանում:

Կենաքանական, էկոլոգիական և ֆիզոցենոլոգիական արանձնահավկություններ: Առու է միջին լեռնային գոտում, ծ. մ. 1500–1800 մ բարձրությունների վրա, լայնատերև անտառներում, ավելի հաճախ անտառների եզրերին, երբեմն գյուղերի մոտ: Ծաղկում է ապրիլ–մայիս ամիսներին, պաղաքերում՝ հունիս–օգոստոսին:

Սահմանափակող գործունեք: Սահմանափակ տարածման և բնակության շրջաններ:

Պահպանության միջոցառություններ: Պոպովյացիայի մի ճարպահպանվում է «Ծիկլահող» պետական արգելոցում։ Անհրաժեշտ է իրականացնել պոպովյացիայի վիճակի մոնիթորինգ։

Category. Endangered species. Endemic of South Transcaucasia. The extent of occurrence and the area of occupancy are less than 500 km². The species faces decline of the extent of occurrence and area of occupancy caused by continuing anthropogenic impact on forest ecosystems.

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Tree about 5 m, without spines. Leaves 6–8 x 2–4 cm, oblong-elliptic, with maximal width in the middle, to the both ends uniform narrowed, at apex acute, at margins regularly crenate-serrate, from below densely tomentose; petioles pubescent, 3–4 cm long. Fruits small, globose, 2 cm in diameter; pedicles longer than fruit.

Distribution. In Armenia it occurs in Zangezur (Nerkin Hand) and Meghri (Vahravar, Tashtun, Lichkvaz, Lichik) floristic regions. EOO is 160 km², AOO is 12 km², the number of locations is 2. Besides Armenia grows in Nakhichevan.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in middle mountain belt, at the altitudes of 1500–1800 meters above sea level, in the forests, more often at forest edges, sometimes in villages' vicinities. Flowering from April to May, fruiting from June to August.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy.

Conservation actions. Part of the population grows in the area of "Shikahogh" State Reserve. Necessary: monitoring of the population state.