

391. *Delphinium foetidum* Lomak. — Ոշլախոր գարշահոր — Живокость вонючая

VU B1 ab(iii) + 2 ab(iii)



© Ելենորա Գաբրիելյան
© Eleonora Gabrielyan

Սկզբնադրյուրներ\References

- Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի նյութեր
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Tахтадյան А. Л. 1954. Род *Delphinium*.
Флора Армении, 1: 140–169. Ереван.
Гроссгейм А. А. 1950. Род *Delphinium*.
Флора Кавказа, 2-е изд., 4: 24–33. Москва–Ленинград.
Еленевский А. Г. Ranunculaceae. Определитель сосудистых растений Армении (рукопись).
Կազմով Մ. Ե. Հովհաննիսյան
Compiler M. E. Oganesian

Կարեղորիս: Խողովի տեսակ է: Կովկասի հնդկամիկ է: Արևարձ մասնաւոված է: Տարածման շրջանի մակերեսը՝ 20000 քառ. կմ-ից պակաս է, բնակության շրջանի մակերեսը՝ 2000 քառ. կմ-ից պակաս: Տեսակին սպասնում է տարածման և բնակության շրջանների կրծառապում՝ ներքին գործուների և աճելավայրերի պայմանների փոփոխության պատճառով:

Հայաստանի Կարմիր գրքի տառչին հրատարակության մեջ ընդգրկված չէ:

Ընդգրկված չէ CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Նկարագրություն: Անդրո հոտով բազմամյա խտաբույս՝ 15–50 սմ բարձրության, խիս ծածկված զեղծային մազիկներով: Տերևները՝ երկար կորուններով, կրտսելու որվազնով, եռարածան, կտրապած ոռմանձև–կրտսելու մասերի: Ողկոյզները՝ սակավածաղիկ: Ծաղկները՝ զիզոնորի, խաճուղի: Ծաղկապատի մասերը՝ մոտ 25 մմ երկարության, կտրտույ:

Տարածում: Հայաստանում աճում է Արագածի (Ղեղագավար՝ Արագած) և Զանգեզուրի (Ղեղագավարեր՝ Մեծ Խշանասար, Կոսպուտչող, Փառական, Յաղլո) ֆլորանի խմբակն շրջաններում: ЕOO 6330 քառ. կմ է, AOO՝ 32 քառ. կմ, թիվախտաները՝ 3: Հայաստանից բացի, աճում է Նախիջևանում և Ղարաբաղում:

Կենսաբնական, Էկոլոգիական և ֆիզիոկենոլոգիական առանձնահարկվություններ: Աճում է ալպյան գոտում, ծ. մ. 2700–3600 մ բարձրությունների վրա, շնձիմերի, բարաքավածքների վրա: Ծաղկում է հուլիս–օգոստոս ամիսներին, պտղաբերում՝ սեպտեմբերին:

Սահմանափակող գործուներ: Սահմանափակ տարածման և բնակության շրջաններ, աճելավայրերի կորուս կամ դեղաբացիա, կիմայի զրուալ փոփոխացիան ենթանարով:

Պահպանության միջոցառություններ: Պոպուլյացիայի մի մասը պահպանվում է «Արագածի ալպյան» պետական արգելավայրի տարածքում: Անհրաժեշտ է իրականացնել պտղաբերացիայի վիճակի մոնիթորինգ:

Category. Vulnerable species. Endemic of the Caucasus. The area of distribution is fragmented. The extent of occurrence is less than 20000 km², area of occupancy is less than 2000 km². The species faces decline of the extent of occurrence and area of occupancy caused by internal factors and changes in habitat conditions.

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Densely glandular perennial herb with unpleasant odour, 15–50 cm. Leaves on long petioles, rounded, 3-partite, with dissected rhomboid-rounded lobes. Racemes few-flowered. Flowers zygomorphic, with spur. Perianth segments about 25 mm long, light blue.

Distribution. In Armenia it grows in Aragats (Aragats Mountain) and Zangezur (mountains Mets Ishkhanasar, Parakan, Yaghlu, Kaputdjugh) floristic regions. ЕOO is 6330 km², AOO is 32 km², the number of locations is 3. Besides Armenia the general area of distribution includes Nakhichevan and Karabagh.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in alpine belt, at the altitudes of 2700–3600 meters above sea level, on screes and “chingils”. Flowering from July to August, fruiting in September.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, loss/degradation of habitats caused by global climate change.

Conservation actions. Part of the population grows in “Aragats alpine” reservation. Necessary: monitoring of the population state.

RANUNCULACEAE — ԳՈՐԾՆՈՒԿԱԶԳԻՆԵՐ — ЛЮТИКОВЫЕ

392. *Ranunculus cicutarius* Schlecht. — Գորդոնկ ցիկուրային — Лютик цикутовый

EN B1 ab(iii) + 2 ab(iii)



© ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

Սկզբանդրյութեր | References

- Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի նյութեր
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
- Տախգջյան Ա. Լ. 1954. Род *Ranunculus*.
Takhgadjyan A. L. 1954. Rod Ranunculus.
- Փլորա Հայաստանի, 1: 180–206. Երևան.
Flora Armeniae, 1: 180–206. Erevan.
- Iranshahr M., Rechinger K. H., Riedl H. 1992. *Ranunculus* L. Flora Iranica, 171: 127–195. Graz.
- Ելենևսկий А. Г. Ranunculaceae. Определитель сосудистых растений Армении (рукопись).
Elenevskiy A. G. Ranunculaceae. Opredelitel' sosoedistykh rastenij Armenii (rukopis').
- Կոմիտե Մ. Է. Հովհաննիսյան
Compiler M. E. Oganesian

Կապեկորիս: Վասնագված տեսակ է: Հայաստանի սրբավայացին զանգվածը լինի Խառնուր տարածման արևմտյան սահմանում: Տարածման և բնակուրյան շրջանների մակերեսը՝ 500 քառ. կմ՝ ից պակաս է: Տեսակին սպառնանում է տարածման և բնակուրյան շրջանների կրծասում աճելավայրերի պայմանների փոփոխության պատճենով:

Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ բնողոված չէ:

Ընդգրկված չէ նաև CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Նկարագրություն: Թափամազ բազմամյա բույս է: Ցորենք՝ ճյուղավոր, 15–40 մմ բարձրության: Ստորին տերևները՝ վետարածն, 3-հասված սեղմենտներով, երկարավաճ զծային մասերով: Վերին տերևները՝ եռակի կամ վետարածն հասված: Ծաղիկները՝ դեղին:

Տարածում: Հայաստանում հանդիպում է միայն Զանգեզուրի ֆլորատիկական շրջանում (Կոսպաս բաղարի և Ներքին Համբ, Ծավ զոտերի շրջակայր): EOO 125 քառ. կմ է, AOO՝ 24 քառ. կմ, բնակչություն՝ 2: Հայաստանին բացի, առում է Արևելյան Կովկասում, Արևելյան Անդրկովկասում, Ղարաբաղում, Թալիշում, Իրանում:

Կենսաբանական, էկոլոգիական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններ: Աճում է ստորին լեռնային զոսում, ծ. մ. 700–1300 մ բարձրությունների վրա, կտղուր-բոխու անտառում, սոսու պորտակում, շիրյակում, բարքարտու լանջերին: Ծաղկում է հունիս ամսին, պտղաբերում՝ հուլիսին:

Սահմանափակող գործունեություններ: Սահմանափակ տարածման և բնակուրյան շրջաններ, աճելավայրերի կորուսա կամ դեղքարացիս՝ մարդածին գործուների ազդեցության և կիմայի գործա փոփոխության հետևանքով:

Պահպանության միջոցառություններ: Համարյա աճբարդ սրբավայացին պահպանվում է «Շիկահօղ» պետական արգելացի տարածում: Անհրաժեշտ է իրականացնել սրբավայացիայի վիճակի մոնիթորինգ:

Category. Endangered species. The sub-population of Armenia is situated in the western border of the main area of distribution. The extent of occurrence and area of occupancy are less than 500 km². The species faces decline of the extent of occurrence and area of occupancy caused by changes in habitat conditions.

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Densely pilose perennial herb. Stem branched, 15–40 cm. Lower leaves pinnate; segments 3-dissected; lobules oblong-linear. Upper leaves 3-sect or pinnatisect. Flowers yellow.

Distribution. In Armenia it occurs in Zangezur (neighborhoods of Kapan city and Nerkin Hand, Tsav villages) floristic region. EOO is 125 km², AOO is 24 km², the number of locations is 2. Besides Armenia the main area of distribution includes the East Caucasus, East Transcaucasia, Karabagh, Talish, Iran.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in lower mountain belt, at the altitudes of 700–1300 meters above sea level, in oak-hornbeam forests, plane grove, shibliak, on stony slopes. Flowering in June, fruiting in July.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, loss/degradation of habitats caused by anthropogenic factor and global climate change.

Conservation actions. Almost the whole population grows in “Shikahogh” State Reserve. Necessary: monitoring of the population state.

RANUNCULACEAE — ՐՈՇԵԼՈՒԿԱՅՈՒԹԻՒՆ — ЛОТИКОВЫЕ

393. Ranunculus lingua L. — Қорығыншың қаркышарылары — Лютик длиннолистный



© Thomas Schoepke
www.plant-pictures.com

Աղյուսակներ\References

Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի
հերքանիութիւնը

Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Гроссгейм А. А. 1950. Род Ranunculus. Флора Кавказа,
2, ч. II, 4: 24–33. Москва. Централ.

Тахаджян А. Л. 1954. Род Ranunculus. Флора Армении, 1: 180–206. Ереван.

Iranshahr M., Rechinger K. H., Riedl H. 1992. Ranunculus L. Flora Iranica, 171: 127–195. Graz.

Davis P. H. Ranunculus L. Flora of Turkey, 1: 146–196.
Edinburgh.

Еленевский А. Г. Ranunculaceae Определитель сосудистых растений Армении (рукопись).

Կազմող՝ Մ. Ե. Հովհաննիսյան
Compiler M. E. Oganesian

Կարեգորիա: Վասնգված տեսակ է: Հայտնի է մեկ պրաբլ-
յոցին: Տարածման և ընակրոյթյան շրջանների մակերեսը 10 քառ.
կմ²-ից պակաս է: Տեսակին սպառնում է տարածման և ընակրոյթյան
շրջանների կրճատում՝ աճեավայրերի պայմանների փոփախության
պատճառով: Նկատի տենենարդը, որ տեսակի հիմնական տարած-
ման շրջանը գտնվում է Հայաստանի սահմաններից դուրս, սպառ-
նալիքի կատեգորիան իշեցվել է մինչև EN:

Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին իրատարակության մեջ
թղթզրկված չէր:

Ընդգրկված չեն CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Նկարգրություն: Բազմացյա խտաբրդյա՝ 50–150 մմ բարձրության: Ցարտանային տերևները՝ երկարավոր ճշտաբածն, սրացած, մինչև 20 մմ երկարության: Ծաղկները՝ դեղին; պասկաքերերը՝ 15–18 մմ երկարության:

Տարածում: Հայաստանում հայտնի է միայն Լոռու Փրաբատիկական շրջանում (Տաշիր քաղաքի, Սպահանվկա, Նովոսելցովս, Կիզ-Կարս գյուղերի շրջակայր): ԱՕՕ՝ 8 քառ. կմ, թվակիւնաք՝ 1: Հայաստանից բացի, աճում է Կովկասում (ցրված), Եվրոպայում, Միջամայ, Հյուսիսային Անատոլիայում, Հյուսիսային Իրանում, Միջին և Կենտրոնական Ասիայում:

Կենարանական, Եղողիսկական և Փիրոցենորդիսկական առանձնահարկություններ: Առու է միջին լեռնային զոտում, ծ. մ. 1400–1500 մ բարձրությունների վրա, ճահիճներում, լերփ ափերին: Ծաղկում է հոնիս ամսին, պատարերում՝ հոյիսին:

Սահմանափակող գործունեություն: Սահմանափակ տարածման և ընակարգության շրջաններ, ամերիկական կուսակցությունների կողման կուտակությունների դեպքերը կազմում են առաջնահարուստ գործունեություններ:

Պահպանության միջազգային օր: Պահպանության օրը նշումը յստեղ չեն իրականացվում: Անթամէն և կազմակերպել հետազոտական աշխատանքներ՝ նոր աճեապայրեր հայտնաբերելու համար, իրականացնել առողջապահության վիճակի մոնիթորինա:

Category. Endangered species. One sub-population is known. The extent of occurrence and area of occupancy are less than 10 km². The species faces decline of the extent of occurrence and area of occupancy caused by changes in habitat conditions. Taking into consideration that the general area of distribution of the species is situated beyond the borders of Armenia the category of threat has been downgraded to EN.

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Perennial herb, 50–150 cm. Cauline leaves elongate-lanceolate, acuminate, up to 20 cm long. Flowers yellow; petals 15–18 mm long.

Distribution. In Armenia it occurs only in Lori (neighborhoods of Saratovka, Novoseltsovo, Kiz-Kala villages, Tashir town) floristic region. AOO is 8 km², the number of locations is 1. Besides Armenia the main area of distribution includes the Caucasus (wide), Europe, Siberia, North Anatolia, North Iran, Middle and Central Asia.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in middle mountain belt, at the altitudes of 1400–1500 meters above sea level, in the swamps, along lake shores. Flowering in June, fruiting in July.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, loss/degradation of habitats caused by drainage of swamps and global climate change.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: monitoring of the population state.

RANUNCULACEAE – ՔՈՐՏՆՈՒԿԱԶԳԻՆԵՐ – ЛЮТИКОВЫЕ

394. Ranunculus villosus DC. — Қарынчылғы шашып — Лютик мохнатый

CRB 1 ab(iii) + 2 ab(iii)



© ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՈՏԱԿԱՆԻ ԽԱՆԴԻՎՈՒԹԻՒՆ
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

Ակղբնադրութեան\References

- Սայանոսիմի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի
հերբարիումի նյութը

Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.

Гроссгейм А. А. 1950. Род *Ranunculus*. Флора Кавказа,
2-е изд., 4: 49–72. Москва–Ленинград.

Манакян В. А. 1974. Флористические находки для не-
которых районов Армении. Биол. журн. Армении, 27,
1: 101–103.

Еленевский А. Г., Дервиз–Соколова Т. Г. 1989. Лютики
(*Ranunculus* L., *Ranunculaceae*) Кавказа. Биол. Моск.
общ. исп. прир., отд. биол., 94, 1: 112–123.

Красная книга Армянской ССР. 1989: 208. Ереван.

Еленевский А. Г. *Ranunculaceae*. Определитель сосудис-
тых растений Армении (рукопись).

Կազմություն՝ Մ. Ե. Օգանեսյան
Compiler M. E. Oganesian

Կարենորիա: Կրիտիկական վիճակում զանազան տեսակ է: Հայտնի է մեկ պարույրացիս: Տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 10 քառ. կմ-ից պահանջական է: Տեսակին սպառնամ է տարածման և բնակության շրջանների կրծասում՝ աճեակայթերի պայմանների փոփոխաւթյան պատճառով:

Հայաստանի Կոմիտի գրքի առաջին հրատարակության մեջ բնդրվելու էր 2 կարգավիճակով՝ հազվագյուտ անսակ:

CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում ընդգրկված չեն:

Նկարգրույթն: Բազմամյա խստարույթ՝ 30–80 մ բարձրության՝ ծածկված երկար չված մազիկների խավառությամբ։ Արմասները տերևները՝ կրուպուն հնգամելքոն, եռարածն, ոչ խոր հսկած լայն աստմանադրցակը սեղմենաների։ Ծաղիկները՝ դեղին։

Տարածություն: Հայաստանում հսկայի բարձր է միայն Զանգեզորի ֆորխատիկական շրջանում (Նակատեն զուտի շրջակայր, Խուտառուի լեռ): AOO 8 քառ. կմ է, բնակչություն՝ 1: Հայաստանից բացի, աճում է Արևելյան Կովկասում, Ղարաբաղում, Թալիշում, Հյուսիսարևելյան Երասում:

Կենսաբանական, Էղորդիական և Փիրոցենոլոգիական արանձնահատկություններ: Ազում է ստորին լանջային զուտում, ծ. մ. 800–1300 մ բարձրությունների վրա, կադառ–բլխաւ անտառներում և մարգագետիններում: Ծաղկում է մայիս–հունիս ամիսներին, պտղաբերում՝ հունիս–օգոստոսին:

Սահմանափակող գործոններ: Սահմանափակ տարրածման և ընակույքան շրջաններ, աճելափայթերի կրուտառ կամ դեգրադացիա՝ մարդածին զարծոնների և կիրայայի գործար վավելիաթարան են առանձին:

Պահպանության միջազգային օր: Պահպանության զբոքության մասինը՝ պարզաբանված և պահպանության մասինը՝ պարզաբանված պահպանը:

Category. Critically endangered species. One sub-population is known. The extent of occurrence and area of occupancy are less than 10 km². The species faces decline of the extent of occurrence and the area of occupancy caused by changes in habitat conditions.

It was included in the first edition of the Red Data Book of Armenia under Category 2: Rare species.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Squarrose-villose perennial herb, 30–80 cm. Basal leaves rounded 5-angular, 3-partite, not deeply dissected to broadly dentate-serrate segments. Flowers yellow.

Distribution. In Armenia it occurs only in Zangezur floristic region (neighborhoods of Chakaten village, mountain Khustup). AOO is 8 km², the number of locations is 1. Besides Armenia the species grows in the East Caucasus, Talish, Karabagh, North-West Iran.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in lower mountain belt, at the altitude of 800–1300 meters above sea level, in oak–hornbeam forests and in the meadows. Flowering from May to June, fruiting in June–August.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, loss/degradation of habitats caused by anthropogenic factor and global climate change.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: monitoring of the population state, search of new habitats.

RANUNCULACEAE — ԳՈՐԾՆՈՒԿԱԶԳԻՆԵՐ — ЛОТИКОВЫЕ

395. *Thalictrum isopyroides* C. A. Mey. — Քնձմնձուկ իզոպիրոնման — Василевник изопиронидный



© Կամիլլա Թամանյան
© Kamilla Tamanyan

VU* B1 ab(iii) + 2 ab(iii)

Կարեղորիս: Խոցելի տեսակ է: Հայաստանում գտնվում է մինչև համար տարածման հյուսիսային սահմանում: Տարածման շրջանի մակերեսը՝ 5000 քառ. կմ—ից պակաս է, բնակության շրջանի մակերեսը՝ 500 քառ. կմ—ից պակաս: Տեսակին սպառնում է տարածման և բնակության շրջանների կրճատում՝ ածելավայրերի պայմանների փոփոխության պատճառով: Տեսակի հիմնական տարածման շրջանը գտնվում է Հայաստանի սահմաններից դորև, ենակարար սպառնալիքի կատակրիան նվազեցված է մինչև VU:

Հայաստանի Կարմիր գրքի տառաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված չէ:

Ընդգրկված չէ CITES-ի և Բեռնի կրնվենցիաների հավելվածներում:

Նկարագրություն: Բազմամյա խտաբարյա՝ 10–30 սմ բարձրության: Տերևները՝ բազմակի փետրածան, ձվաձև նշանաբան մասերով 2–3 (5) մմ երկարությամ: Ծաղկաբույլ՝ հորան, օվալաձև, փոքր, բազմաթիվ ծաղիկներով: Ծաղկումից հետո ծաղկակորերը տժել երկարացող, հորիզոնական հետացած: Ծաղկապատճ՝ բաժականման, վաղ բափոր:

Տարածում: Հայաստանում տարածված է Երևանի (Երևան, Երևանի և Երանի լեռնաշրաններ, Ասին գյուղ) և Դարեղեկի (Տիգրանավան և Զանգակատան զյուղերի միջև, Խաչիկ, Գնիշիկ) ֆլորաախիական շրջաններում: EOO 720 քառ. կմ է, AOO՝ 44 քառ. կմ, բնակչությունը՝ 5: Հայաստանից բացի, աճում է Նախիջևանում, Հարավարևմտյան, Սիրիա և Կենարքանկան Ասիայում:

Կենսաբանական, էկոլոգիական և ֆիզիոգենոլոգիական տառանձնահարկություններ: Աճում է միջին և վերին լեռնային գոտիներում, ծ. մ. 1000–2200 մ բարձրությունների վաս, բարքարտ լանջերին: Ծաղկում է մայիս ամսին, պատրերում՝ հունիսին:

Սահմանափակող գործուներ: Սահմանափակ տարածման և բնակության շրջաններ, ածելավայրերի կորուս կամ դեգրադացիա՝ մարդածին գործոնի ազդեցության հետևանքով:

Պահպանության միջոցառություններ: Պահպանությունը չի իրականացվում: Անհրաժեշտ է իրականացնել պապուլյացիայի վիճակի մոնիթորինգ:

Category. Vulnerable species. The sub-population of Armenia is situated in the northern border of the main area of distribution. The extent of occurrence is less than 5000 km², area of occupancy is less than 500 km². The species faces decline of the extent of occurrence and area of occupancy caused by changes in habitat. The main area of distribution of the species is situated beyond the borders of Armenia, thus the category of threat has been downgraded to EN.

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Perennial herb, 10–30 cm. Leaves multi-pinnate; lobes ovate-lanceolate, 2–3 (5) mm long. Panicle oval, small, many-flowered. Pedicels after flowering elongating, horizontally spreading. Perianth calyx-shaped, early deciduous.

Distribution. In Armenia it occurs in Yerevan (Yerevan, Yeranos and Yerakh mountain ranges, Asni village) and Darelegis (between the villages Tigranashen and Zangakatun, Khachik, Gnishik) floristic regions. EOO is 720 km², AOO is 44 km², the number of locations is 5. Besides Armenia the species grows in Nakhichevan, South-West, Middle and Central Asia.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in middle and upper mountain belts, at the altitudes of 1000–2200 meters above sea level, on stony slopes. Flowering in May, fruiting in June.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, loss/degradation of habitats caused by anthropogenic factor.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: monitoring of the population state.

Ակղբնադրյութեր\References

- Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբնության ինստիտուտի հերբարիումի նյութերը
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Гроссгейм А. А. 1950. Род *Thalictrum* L. Флора Кавказа, 2-е изд., 4: 72–75. Москва–Ленинград.
- Тахтаджян А. Л. 1954. Род *Thalictrum*. Флора Армении, 1: 219–225. Ереван.
- Davis P.H., Coode M.J.E., Cullen E. 1965. *Thalictrum* L. Flora of Turkey, 1: 199–203. Edinburgh.
- Riedl H. 1992. *Thalictrum* L. Flora Iranica, 171: 114–126. Graz.
- Еленевский А. Г. Ranunculaceae. Определитель сосудистых растений Армении (рукопись).
Կողմոց Մ. Ե. Հովհաննիսյան
Compiler M. E. Oganessian

RESEDAEAE — ՀԱՓՈՒԿԱԶԳԻՆԵՐ — РЕЗЕДОВЫЕ

396. *Reseda globulosa* Fisch. & C.A.Mey. — Նախուկ զնդապրուղ — Резеда шароплодная



© Էլենոր Գաբրիելյան
© Eleonora Gabrielyan

Ակդրտագրություն | References

- Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերթափառ նյութեր
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Красная книга Армянской ССР. 1989: 208. Ереван.
Гросгейм А. А. 1950. Род Reseda. Флора Кавказа, 4: 253–256.
Мулкиджянян Я. И. 1966. Род Reseda. Флора Армении, 5: 302–309. Ереван.
Կազմութեան Ա. Ա. Ներսեսյան
Compiler A. A. Nersesyan

Կապեկորիս: Կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ է: Կովկասի հնդեմիկ է: Հայաստանում հայտնի է մեկ պոպուլյացիա: Տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 10 քառ. կմ-ից պակաս է: Աճում է հիստեսիկ տնտեսական գործունեության ենթարկվող տարածքում:

Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված էր 1 կարգավիճակով՝ ոչնչացման պատճառից ենթակա տեսակ:

CITES-ի և Բնոնի կոնվենցիաների հավելվածներում ընդգրկված չէ:

Նկարագրություն: Երկանյա կամ միանյա բույս է: Ցողունները՝ մերկ: Տերևները՝ հնգարևալ: Բրակները նեղ բխածեն, վճռով հեռացող, տերևի վերին կետամ: Ծաղկաբույլը ճյուղները՝ դեպի վեր սղղմանած: Բաժնակաբերերը՝ զծային, պտղի ժամանակ՝ պահպանվող և հաճարյա չմնացող: Տոմիկը՝ զնդաձև տափակացած, երկարությունից լայն:

Տարածում: Աճում է Մելրու ֆլորաստիկական շրջանում (Ազարակ, Նյուվադի): AOO 8 քառ. կմ է, տկաչիտուր՝ 1: Հայաստանից բացի, հանդիպում է Նախալովկաստ, Սեծ Կովկասյան լեռների վրա, Կենտրոնական և Արևելյան Անդրկովկաստ:

Կենսաբանական, էկոլոգիական և ֆիզիոնոմոգիական առանձնահատկություններ: Աճում է ստորին լեռնային գոտում, ծ. մ. 800–1000 մ բարձրությունների վրա, չոր բարքարտ լանջերին, ֆրիզանանամատ հանակեցրություններում: Ծաղկում է մայիս–հունիս ամիսներին, պտղաբերում՝ հունիս–հուլիսին:

Պահպանավակող գործունեություններ: Սահմանափակված տարածման և բնակության շրջաններ, աճելավայրերի կորուս կամ դեգրադացիա՝ հանքարդյունահանող արդյունաբերության, ճանապարհաշինության, զյուղատնտեսական հանդակների համար հղուտարածքների յուրացման հետևանքով:

Պահպանավակող միջոցառություններ: Պահպանության գործողություններ չեն իրականացվում: Անհրաժեշտ է իրականացնել պրակտիկայի վիճակի մոնիթորինգ, ստուգել նոր ԲՀԴՏ Սեղրու շրջանի Ազարակ ավանդի շրջակայրում:

Category. Critically endangered species. Endemic of the Caucasus. One sub-population is known in Armenia. The extent of occurrence and the area of occupancy are less than 10 km². The species grows in the area of intensive economic activity.

It was included in the first edition of the Red Data Book of Armenia under Category 1: Endangered species.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Annual or biennial plants. Stems glabrous. Leaves 5-lobed, lobes narrowly spatulate, dividing in the upper part of the leave. Inflorescence branches appressed. Sepals linear, at fruits persistent and almost not enlarging. Capsule globose, compressed, more broad than long.

Distribution. In Armenia it grows only in Meghri floristic region (Agarak, Nyuvad). AOO is 8 km², the number of locations is 1. Besides Armenia the species grows in Ciscaucasia, Greater Caucasus Mountain range, Central and East Transcaucasia.


Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in lower mountain belt, at the altitude of 800–1000 meters above sea level, on dry stony slopes, among phryganoid vegetation. Flowering from May to June, fruiting in July.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, loss/degradation of habitats caused by mining industry, road construction, development of lands for arable purposes.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: establishment of specially protected nature area in the neighborhoods of Agarak settlement in Meghri region, monitoring of the population state.

ROSACEAE — ՀԱՐԴՎՈՐԻՆԵՐ — РОЗОЦВЕТНЫЕ

397. Amygdalus nairica Fed. et Takht. — Նշենի նախրյան — Миндаль нарийский



© Մարինե Հովհաննիսյան
© Marine Oganessian

Այլ բնագիրներ\References

Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի
հերբարիումի նյութեր

Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Красная книга Армянской ССР. 1989: 209–210. Ереван.
Мулкиджян Я. И. 1958. Род *Amygdalus*. Флора Армении, 3: 318. Ереван.

Կազմող՝ Ժ. Ա. Հակոբյան
Compiler Zh. A. Hakobyan

Կապեկորիս: Վասնագիծ տեսակ է: Հարսավյան Անդրկովկասի էմպեմի է: Տարածման շրջանի մակերևույթ 5000 քառ. կմ-ից պահանջվում է, ընդունուած դրամի մասնելուն՝ 500 քառ. կմ-ից պահանջվում է:

Հայուսանի Կարմիր զրբքի առաջարկը ուղղված է առաջին հայուսական մեջ թագավորական պատճենական պահպանավորության համար:

Ընդգրկված չեն CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Նկարագրություն: Ոչ բարձր բռն՝ 1–2 մ բարձրության, փոփած ճյուղավորված, շատ փշաց ճյուղերով: Տերևները՝ բայլ հսատակաշի, մերկ, երկարավող նշանածն, ամբողջազգ կամ աղեղնածն արդյանք, մասր 2–2,5 (3) ամ երկարության, 0,6–0,8 ամ բայցության: Կորպասպատմերը ծվածե—օվալ, բավշային, տափակած, կարճ սրածալուր:

Տարածություն: Առաջին է Զանգեզուրի (Որստան գետի կիրճ) և Մելքոն (Արար գետի կիրճ) ֆիրմատիկական շրջաններում: ԵՕԾ 940 քառ. կմ է, AOO՝ 60 քառ. կմ, թկալիտետները՝ 5: Հայաստանից բարձր առաջին է Նախիջևանում:

Կենարանական, **Էղողդիսական** և **Փիրոցենոլոգիական** առանձինահավկույթունները: Աճում է ստորին և միջին լուսային գոտիներում, ծ. մ. 600-1800 մ բարձրությունների վրա, չոր բարքարու լանջերին, բարարափածքների վրա, ժայռա տեղերում, ֆրիզանանման բուսականության մեջ, արդի նորսանտառում: Ծաղկում է ապրիլ-մայիս ամիսներին, պատարերում՝ հունիս-սեպտեմբերին:

Սահմանափակող գործներ: Սահմանափակ տարրածման և ընկալության շրջաններ, ածելափայրերի կորուս կամ դեգրադացիք՝ զբարանական հանրական բարերի համար հոդատարածքների յուրացման և լառնասարդութանանող արվանաքերաբյան գործության ինտենսիվացման հետևանքով:

Պահպանության միջոցառություններ: Պարբռյացիայի մի մասը պահպանվում է՝ «Արևիկ» ազգային պարկի սահմաններում։ Անհրաժեշտ է իրականացնել պարբռյացիայի վիճակի նոնիքորենից, ստեղծել նոր ԲՀՊՏ Սելրու շրջանի Ազգարկ ավանի շրջակայրում։

Category. Endangered species. Endemic of South Transcaucasia. The extent of occurrence is less than 5000 km², area of occupancy is less than 500 km².

It was included in the first edition of the Red Data Book of Armenia under Category 1: Endangered species.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Diffuse, branched, with very spiny branches shrub, 1–2 m. Leaves semicoriaceous, glabrous, oblong-lanceolate, smooth-edged or crenate-serrate, 2–2.5 (3) x 0.6–0.8 cm, narrowed into petiole. Fruits ovate-oval, velutine, compressed, with small mucro.

Distribution. In Armenia it grows in Zangezur (Vorotan river valley) and Meghri (Araks river valley) floristic regions. EOO is 940 km², AOO is 60 km², the number of locations is 5. Besides Armenia the species grows in Nakhichevan.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in lower and middle mountain belts, at the altitudes of 600–1800 meters above sea level, on dry stony slopes, on scree, among phryganoid vegetation, in arid open forests. Flowering in April–May, fruiting in July–September.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, loss/degradation of habitats caused by the intensity of mining industry and development of lands for arable purposes.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: establishment of specially protected nature area in the neighborhoods of Agarak settlement in Meghri region, monitoring of the population state.

ROSACEAE — ՎԱՐԴԱՉԳԻՆԵՐ — РОЗОЦВЕТНЫЕ

398. *Crataegus microphylla* K.Koch — Սղնի, ալոճ փորբազերս — Боярышник мелколистный



© ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

Աղբյուրներ/References

Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի նյութեր
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Саркисян М. В. 2007. Конспект рода *Crataegus* L. (Rosaceae) во флоре Армении. Актуальные проблемы ботаники в Армении. Мат. Междунар. Конференции. Ереван: 160.

Կազմող՝ Ժ. Ա. Հակոբյան
Compiler Zh. A. Hakobyan

EN B1 ab(iii) + 2 ab(iii)

Կապեգորիա: Վասանգված տեսակ է: Տարածման շրջանի մակերեսը 5000 քառ. կմ—ից պակաս է, բնակչության շրջանի մակերեսը՝ 500 քառ. կմ—ից պակաս:

Հայաստանի Կոտայքի գրքի տասշին իրատարակության մեջ բնդզրկված չէ:

Ընդգրկված չէ CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Նկարագրություն: Թուփ՝ 2–2,5 մ բարձրության, մոխրագոյն կեղևով, փորբարի բարակ փշերով: Տերևները՝ 1–3 մմ երկարության, 1–1,8 մմ լայնության, սկզբում երկու կողմից բավար, հետագայում համարյա մերկ, (3) 5–7 բաժանված, մեծմասամբ երկարավուն ձվաձև, հազվադեպ օվալ տառանածն կամ սղենածն եօրերով: Ծաղկաբարյութ՝ 4–10 ծաղկեներով: Պտաղները՝ 9–12 մմ երկարության, երկարավուն լինսաձևից մինչև տանձանման:

Տարածում: Հանդիսանում է Խցկասնի (Կիրանց, Ուվեսար, Շամբալ, Ախուսար) և Զանգեզուրի (Ներքին Հանդ, Վերին Խոսանան) ֆլորատիպիկական շրջաններում: EOO 3500 քառ. կմ է, AOO՝ 20 քառ. կմ, բնակչութեանը՝ 4: Հայաստանից բացի, աճում է Արևմտյան Նախավայկասանմ, Արևմտյան և Արևելյան Անդրկովկասանմ, Նախկնանում, Թափշում, Իրանում:

Կենսաբանական, էկոլոգիական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններ: Աճում է սոտրին լեռնային զոտում, ծ. մ. 800–1200 մ բարձրությունների վրա, աճատակ եզրերին: Ծաղկում է մայիս ամսին, պտղաբերում՝ սեպտեմբեր–հոկտեմբերին:

Պահմանափակող գործունեություն: Պահմանափակ տարածման և բնակչության շրջաններ, աճելավայրերի կորուս կամ դեգրադացիա՝ անտառանական գործունեության հետևանքով:

Պահպանության միջոցառություններ: Պարույրացիայի մի մասը պահպանվում է «Շիկահող» պետական արգելոցի տարածքում: Անհրաժեշտ է իրականացնել պարույրացիայի վիճակի մոնիթորինգ:

Category. Endangered species. The extent of occurrence is less than 5000 km², area of occupancy is not less than 500 km². The species grows in the area of intensive economic activity.

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Shrub 2–2,5 m, with grey bark. Spines usually few, thin. Leaves 1–3 x 1–1,8 cm, at early stages pubescent from the both sides, later becoming almost glabrous, (3) 5–7-partite, usually oblong–ovate, rarely leaf lobes oval with dentate or crenate margins. Inflorescence 4–10-flowered. Fruits 9–12 mm long, oblong–elliptic or ovate to pyriform.

Distribution. In Armenia it occurs in Idjevan (Kiranc, Voskepar, Shamluh, Akhtala) and Zangezur (Nerkin Hand, Verin Khotanan) floristic regions. EOO is 3500 km², AOO is 20 km², the number of locations is 4. Besides Armenia the species grows in West Ciscaucasia, West and East Transcaucasia, Nakhichevan, Talish, Iran.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in lower mountain belt, at the altitudes of 800–1200 meters above sea level, at forest edges. Flowering in May, fruiting from September to October.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, loss/degradation of habitats caused by forestry activities.

Conservation actions. Part of the population grows in “Shikahogh” State Reserve. Necessary: monitoring of the population state.

ROSACEAE – ՔԱՐԴԱԶԻՆԵՐ – РОЗОЦВЕТНЫЕ

399. Crataegus pontica K. Koch — Աղնի, ալոճ պրովական — Боярышник pontийский



© Էլենորա Գաբրիէլյան

The planning function\References

Հայաստանի ԳԱԱ Բուժաբանության ինստիտուտի
ինքնառօրինակ նույնը

Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Красная книга Армянской ССР. 1989: 210. Ереван.

Саркисян М.В. 2007. Конспект рода *Crataegus* L.

Баранов Г.Н., 2007. Концепция рода *Stachys* L. (Rosaceae) во флоре Армении. Актуальные проблемы ботаники в Армении. Мат. Междунар. Конференции. Ереван: 161.

Կազմող՝ Ժ. Ա. Հակոբյան
Compiler Zh. A. Hakobyan

VU B I ab(iii) + 2 ab(iii)*

իշեցվել է միջն և տասնական ըստ ընթացակարգ արեալի պատճեառով։ Հայաստանի Կարմիր զորի առաջին հրատարակության մեջ բնութանակ եղ 2 խոսունիւններ՝ հասանաւուն մասն։

Ենողությանց մասին CITES-ի կ բերի լուսավորելու համար կազմակերպություն:

Նկարագրություն: Ոչ բարձր ծառ կամ թոփ՝ 3–6 մ բարձրության: Տերևները կաշենան, բաց կամած, երկու կողմից փափով մատաստուածած, պարզ, հակածված կամ ոտքածած, խոր 5–7-բաժան, եռարդակ սեպածն ինիքով: Պտուղները՝ դեղին, կրոսավոր օվալ կամ տասնածածն, թիրավալի կողենով, թույլ բավարար, կորիհճերով 4–5.

Տարածում: Հանդիպում է Երևանի (<Խոսրվակ Անտառ> պետական արգելոց, Ուրցաձոր, Դագնա) և Դարեղեզիսի (զյոյշ՝ Արենի) ֆլորիստիկական շրջաններում: EOO 280 քառ. կմ է, AOO՝ 16 քառ. կմ, լոկալիտետները՝ 4: Հայաստանից բացի, աճում է Վենետոնիական և Արևելյան Անդրկովկասում, Կենտրոնական և Հյուսիսարևմտյան Անսառոյիսայում, Իռարում, Խոսրում և Սիօնի Կոփատամ:

Կենսաբանական, Էկոլոգիական և Փիտոֆենոլոգիական առանձնահատկություններ: Աճում է տարրին և միջին լեռնային գոտիներում, ծ. մ. 800–1800 մ բարձրությունների վրա, չոր բարքու լամցերին, կաղնու և զիկու նորպանտառներում: Ծաղկում է մայիսին, պատղաքերում՝ հունիս–հուլիսներին: Չորադիմացկուն գեղագրադային տեսակ է, լավ մեղքատու, ունի արժեքավոր բնափայտ՝ իրեր պատրաստելու համար:

Սահմանափակը գործները: Սահմանափակ տարածնան և բնակության շրջաններ, աճելավայրերի կորուստ կամ դեգրադացիա՝ կապված անտառախնդեսական գործունեության հետ:

Դասանության միջցարարներ: Պատվաստայի մի ճակա պահպանություն է «Խորապես անտառ» պետական արգելայի տարածքում: Անդրամեջ է իրականացնել պահպատայի փեճակի ճնշերթինք:

Category. Vulnerable species. It is rarely met within the whole area of distribution of the species. The extent of occurrence and area of occupancy are less than 500 km². The main area of distribution of the species is situated beyond the borders of Armenia, thus the category of threat has been downgraded to VU.

It was included in the first edition of the Red Data Book of Armenia under Category 2; Rare species.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Small tree or shrub, 3–6 m. Leaves coriaceous, light green, softly pubescent from the both sides, entire, obovate or rhomb-shaped, 3-lobed with cuneate base, deeply 5–7-partite. Fruits yellow, rounded-ovate or pyriform, slightly ribbed, slightly pubescent; pyrenes 4–5.

Distribution. In Armenia it grows in Yerevan ("Khosrov" State reserve, Urtsadzor, Dagna) and Darelegis (village Areni) floristic regions. EOO is 280 km², AOO is 16 km², the number of locations is 4. Besides Armenia the species grows in Central and East Transcaucasia, Central and North-West Anatolia, Iraq, Iran, Middle Asia.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in lower and middle mountain belts, at the altitudes of 800–1800 meters above sea level, on dry stony slopes, in oak and juniper open forests. Flowering in May, fruiting from June to October. Xerophyte decorative plant, melliferous, with valuable timber.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy, loss/degradation of habitats caused by forestry activity.

Conservation actions. Part of the population grows in "Khosrov Forest" State Reserve. Necessary: monitoring of the population state.

ROSACEAE — ՎԱՐԴԱՉԳԻՆԵՐ — РОЗОЦВЕТНЫЕ

400. *Crataegus szovitsii* Pojark. — Սղնի, ալոճ Շովիչի — **Боярышник Шовица**

CRB I ab(iii) + 2 ab(iii)



© ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

Սկզբանադրյութեավանդներ | References

- Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի նյութը
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
- Федоров А. А. 1958. Род Crataegus. Флора Армении, 3: 296. Ереван.
- Саркисян М. В. 2007. Конспект рода Crataegus L. (Rosaceae) во флоре Армении. Актуальные проблемы ботаники в Армении. Мат. Междунар. Конференции. Ереван: 162.
- Կազմող՝ Ժ. Ա. Հակոբյան
Compiler Zh. A. Hakobyan

Կապեկորիս: Կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ է: Տարածման և բնակույթան շրջանների մակերեսը 10 քառ. կմ-ից պակաս է:

Հայաստանի Կարմիր գրքի տասշին իրատարակության մեջ ընդգրկված չէ:

Ընդգրկված չէ CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հսկելվածներում:

Նկարագրություն: Խորի կամ ոչ մեծ ծառ՝ 1–2 մ բարձրության, զորշ մոխրագոյն կեղևով, փոքրաթիվ բարակ փշերով: Տերևները՝ պինդ, թխակապոյտ, առանդի բավարար, կազմված 3–5 նեղ բրակներից՝ լայն ծափած ուժքանման որվագծով: Ծաղկաբարյերը՝ խիս, 10–12 ծաղկելուրով, սպիտակ-բարիքավոր: Պտուղները՝ հսմայրյա զնյածն, կրտսեր, կարմրավուն, բերևակի բավար, 3–4 կորիզներով:

Տարածում: Հանդիպում է Գարեջազի ֆլորատիկական շրջանում, Եղեգնաձորի շրջակայրում: AOO 4 քառ. կմ է, թկալուսները՝ 1: Հայաստանից բացի, աճում է Նախիչևնում, Արևելյան Անդրկովկասում, Ղարաբաղում, Անսառույսում և Իրանում:

Կենսաբանական էկոլոգիական և ֆիզիոգենոլոգիական առանձնահատկություններ: Աճում է միջին լեռնային զոտում, ծ. մ. 1200–1300 մ բարձրությունների վրա, աճում է եզրերն, բիոտոններում: Ծաղկում է մայիս ամսին, պտղաբերում՝ հունիս–հոկտեմբերին:

Սահմանափակող գործոններ: Սահմանափակ տարածման և բնակության շրջաններ:

Պահպանության միջոցառություններ: Պահպանություն չի իրականացվում: Անհրաժեշտ է կազմակերպել հետազոտական աշխատանքներ՝ նոր աճելափայտեր հայտնաբերելու հսմաք, իրականացնել պրայուցիչայի վիճակի մոնիթորինգ:

Category. Critically endangered species. The extent of occurrence and area of occupancy are less than 10 km². The species grows in the area of intensive economic activities.

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Shrub or small tree with brownish-grey bark, 1–2 m. Spines usually few, thin. Leaves solid, glaucous, adpressed pubescent, broadly ovate-rhomboid, with 3–5 narrow lobes. Inflorescence dense, 10–12-flowered, tomentose-white. Fruits almost globose, ribbed, slightly pubescent, reddish; pyrenes 3–4.

Distribution. In Armenia it occurs in Darelegis floristic region, in neighborhoods of Yeghegnadzor. AOO is 4 km², the number of locations is 1. Besides Armenia the species grows in Nakhichevan, East Transcaucasia, Karabagh, Anatolia, Iran.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in middle mountain belt, at the altitude of 1200–1300 meters above sea level, at forest edges, in the shibliak. Flowering in May fruiting in July–October.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: monitoring of the population state, search of new habitats.

ROSACEAE — ՎԱՐԴԱՀԱԳԻՆԵՐ — РОЗОЦВЕТНЫЕ

401. Crataegus tournefortii Griseb. — Ազնի, ալոճ Տուրքեֆորի — Боярышник Турнефора



© ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի եղբարձրական
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

Литература\References

Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի
հեռախոսից նույնը

Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA. Саркисян М. В. 2007. Конспект рода *Crataegus* L.(Rosaceae) во флоре Армении. Актуальные проблемы ботаники в Армении. Мат. Междунар. Конференции. Ереван: 162.

Կազմող՝ Ժ. Ա. Հակոբյան
Compiler Zh. A. Hakobyan

Կապեկորիս: Խոցելի տեսակ է: Հայտնի են երկու պատրիացիաները: Տարածման շրջանի մակերեսը՝ 5000 քառ. կմ-ից պակաս է, բնակչության շրջանի մակերեսը՝ 500 քառ. կմ-ից պահպաս: Տեսակի բայց ընդհանուր արեալը պատճառով սպառնալիքի կատեգորիան հօգեցվել է մի աստիճանով:

Հայոց կ ար ամառամազ:

Ընդգրկված չեն CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Նկարգրություն: Թողի կամ ոչ մեծ ծառ՝ 2-2,5 մ բարձրության: Տերևները՝ վերկից՝ մուգ կանաչ, ծածկված կարճ առանցք զանգոր մազիկներով, ասկից՝ ավելի բաց գույնի, խփան մոխրագույն բարդությամբ: Կորերը՝ խավաճագրա: Ծաղկաբաժիր՝ փարբաժիր ծաղիկներով: Պտտադիմը՝ կարմիր բարագույն:

Տարածություն: Հանդիսանում է Խցկանի (Կորփ զբուղի շրջակայր) և Զանգեզուրի (Գորիսի և Ազարաց զբուղի շրջակայր) ֆլորիստիկական շրջաններում: EOO 3935 քառ. կմ և, AOO՝ 16 քառ. կմ, լոկալականները՝ 3: Հայաստանից բացի, աճում է Նախիչևանում, Եվրոպայում, Ղրիմում:

Կենարանական, Էղողդիական և Փիրոցներոցիական առանձնահավկոյթյուններ: Առու է. միջին լեռնային գոտում, ծ. մ. 1300–1400 մ բարձրությունների վրա, կազմության անսառների եզրերին, բարքարան լանջերին, բժիշտներում: Ծաղկում է մայիս-հունիս ամիսներին, պատրարերում՝ օգոստոս–հոկտեմբերին:

Սահմանափակող գործոններ: Սահմանափակ ապահովագործության և բնակության շրջաններ:

Պահպանության միջոցառություն: Պահպանությունը չի իրականացվում: Անհրաժեշտ է իրականացնել պրադացիայի փհճակի ճնշերթինեց:

Category. Vulnerable species. Two sub-populations are known. The extent of occurrence is less than 5000 km², area of occupancy is less than 500 km². The category of threat has been downgraded to VU because of wide area of general distribution.

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

Description. Shrub or small tree, 2–2,5 m. Leaves from above dark green, covered with short adpressed crisped hairs, from below more light, with dense grayish pubescence; petioles villose. Inflorescence few-

Distribution. In Armenia it grows in Idjevan (neighborhoods of Koti village) and Zangezur (Goris and neighborhoods of Adjabadzh village) floristic regions. EOO is 3935 km², AOO is 16 km², the number of locations is 3. Besides Armenia the species grows in Nakhichevan, Europe, Crimea.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in middle mountain belt, at the altitudes of 1300–1400 meters above sea level, at the edges of oak and hornbeam forests, in the steppe shrubs. Flowering from May to July, fruiting from August to October.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: monitoring of the population state.

ROSACEAE — ՎԱՐԴԱՉԳԻՆԵՐ — РОЗОЦВЕТНЫЕ

402. *Crataegus ulotricha* Pojark. — Սղի, ալոճ զանգրամազիկավոր — Боярышник курчавоволосистый

CR B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)



© ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

Ակդրայութենիք | References

- Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումից նյութեր
Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Саркисян М.В. 2007. Конспект рода *Crataegus* L. (Rosaceae) во флоре Армении. Актуальные проблемы ботаники в Армении. Мат. Междунар. Конференции. Ереван: 160.
Կազմող՝ Ժ. Ա. Հակոբյան
Compiler Zh. A. Hakobyan

Կապեկորիս: Կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ է: Հայաստանի ենդեմիկ է: Տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 10 քառ. կմ-ից պակաս է:

Հայաստանի Կարմիր գրքի տասշին իրատարակության մեջ ընդգրկված չէ:

Ընդգրկված չէ CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հսկելվածներում:

Նկարագրություն: Խորի կամ ոչ մեծ ծառ՝ 2–5 մ բարձրության, բոլոր վշտու ճյուղերով: Տերևները՝ երկգոյն, վերևից՝ խավու-կանաչ, տակից՝ մոխրագոյն զանգրահեր, փափուկ, վեգետացիայի վերջում անհետացող բավոսությամբ, լայն ձվաձև կամ ռոմբաձև, ոչ խոր խորրոշակ, անհավասար տղոցած կամ բայլ կտրտված եզրերով: Ծաղկաբարյալ փարբարիվ ծաղիկներով: Պտուղները՝ մուգ ծիրանացյան կամ համարյա և, զննած կամ էլիպսաձև, կարմիր բավարյան, 2–4 կորիզներով:

Տարածում: Աճում է Զանգեզուրի ֆլորատիկական շրջանում (Թամայի լեռնանց): AOO 8 քառ. կմ է, թվականական՝ 1:

Կենսաբանական, էկոլոգիական և ֆիզիոգենոլոգիական առանձնահակույյուններ: Աճում է միջին լեռնային գոտում, ծ. մ. 1400–1500 մ բարձրությունների վրա, կաղնա-բոխու անտառների եզրերին, նորաբնտառում, կիրճերի լանջերին: Ծաղկում է հունիս ամսվին, պտղաբերում՝ հուլիս–հոկտեմբերին:

Սահմանափակող գործունեություն: Սահմանափակ տարածման և բնակության շրջաններ:

Պահպանության միջոցառություններ: Պահպանություն չի իրականացվում: Անհրաժեշտ է իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ՝ պրարտացիայի ծավալը և կտրուցվածքը ճշտելու և նոր աճելավայրերի հայտնաբերելու համար, պրարտացիայի վիճակի մոնիթորինգ:

Category. Critically endangered species. Endemic of Armenia. The extent of occurrence and area of occupancy are less than 10 km².

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Description. Shrub or small tree, 2–5 m, with slightly spiny branches. Leaves bicolor, from above dull green, from below greyish; with crisped, soft, disappearing at the end of vegetation pubescence; broadly ovate or rhomb-shaped, not deeply 3-lobed; at the margins unequally serrate or slightly incised. Inflorescence few-flowered. Fruits dark purple or almost black, globose or elliptic, cherry-red; pyrenes 2–4.

Distribution. It grows in Zangezur floristic region (Tass mountain pass). AOO is 8 km², the number of locations is 1.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in middle mountain belt, at the altitude of 1400–1500 meters above sea level, at the edges of oak-hornbeam forests, in the open forests, on the rocky slopes of river gorges. Flowering in June, fruiting in July–October.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy.

Conservation actions. No conservation actions. Necessary: survey on population numbers and range, search of new habitats, monitoring of the state of the population.

ROSACEAE — ՎԱՐԴԱՀԱԳԻՆԵՐ — РОЗОЦВЕТНЫЕ

403. Crataegus zangezura Pojark. — Ազնի, ալոճ զանգեզուրյան — **Боярышник занげзурский**



© ՀՀ ԳԱԱ. Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիում
© Herbarium of the Institute of Botany of NAS of Armenia

Using the References

Հայաստանի ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի
հեռարկանից նույնը

Herbarium materials of the Institute of botany of NAS RA.
Федоров А.Н. 1958. Род Crataegus. Флора Армении,
3: 300. Ереван.

Саркисян М. В. 2007. Конспект рода *Crataegus* L. (Rosaceae) во флоре Армении. Актуальные проблемы ботаники в Армении. Мат. Междунар. Конференции. Ереван: 160.

Կազմող՝ Ժ. Ա. Հակոբյան
Compiler Zh. A. Hakobyan

EN B 1 ab(iii) + 2 ab(iii)

Վագրեցորիս: Վատանգված տեսակ է: Հայոսաւանի էնդեմիկ է: Հայութի ներկու պրաբլազիաներ: Տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 500 քառ. կմ-ից պահպան է:

Հայստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ
ընդգրկված չէ:

Ընդգրկված չեն CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Նկարգրություն: Թոփ՝ մինչև 2 մ բարձրացնամք, բարակ, մերկ կամ թերեւակի նազար, գորշ մոխրագույն թնձոյտներով: Տերևները՝ մերկ, պատաքերայ ճրադերի վրա երկարացնե հակածվածե, նեղ սեպածե հիմքով, 3-5 թթակներով՝ սուր, վերևում խոշորաասած: Ծաղկաբույր՝ փառքաքի ծատիկներով: Պատուղները՝ մանր, 0,8-1 մմ երկարացնան, կարծ էլիպսածե, սև ծիրանագույն, 1-3 կորիզներով:

Տարածություն: Հանենիսպոն է Հանենզգործ Փոքրիստոնեական շրջանում («Շիկահող» պետական արգելոց, Կապանի և Գորիսի շրջակայր): ԵՕԾ 320 քառ. կմ է, ԱՕՕ՝ 16 քառ. կմ, լոկալիտետներ՝ 3:

Կենարանիական, Էլորդիական և Ֆիքրունուրիական առանձնահագություններ: Առմտ է միջին և լեռնային գոտում, ծ. մ. 1200-1800 մ բարձրությունների վրա, նորանուստում, շիրպակում, կիրճերի լանջերին: Ծաղկում է հոնին ամսին, պատրաերում՝ հովիս-հովանեմբերին:

Սահմանափակող գործուներ: Սահմանափակ տարածման և բնակության շրջաններ:

Պահպանության միջցառումներ: Պապուլացիայի մի մասը պահպանվում է՝ «Ծիկահար» պետական արգելոցի տարածքում։ Անհրաժեշտ է իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ՝ պրապուլացիայի ծավալը և կատողվածքը ճշգրիտ և նոր ամելավայրեր հայտնաբերելու համար։ պրապուլացիայի վիճակի նոնհերթինգ։

Category. Endangered species. Endemic of Armenia. Two sub-populations are known. The extent of occurrence and area of occupancy are less than 500 km².

It was not included in the first edition of the Red Data Book of Armenia.

It is not included in the Annexes of CITES and that of the Bern Convention.

Distribution. Grows in Zangezur ("Shikahogh" State Reserve, surroundings of the towns Goris and Kapan) floristic regions. EOO is 320 km². AOO is 16 km², the number of locations is 3.

Ecological, biological and phytocoenological peculiarities. Grows in middle mountain belt, at the altitudes of 1200–1800 meters above sea level, at forest edges, shibliak, rocky slopes of river gorges. Flowering in June, fruiting from July to October.

Limiting factors. Restricted extent of occurrence and area of occupancy.

Conservation actions. A part of the population grows on the territory of "Shikahoh" State reserve. Necessary: survey on population numbers and range, search of new habitats, monitoring of the state of the population.